

RECOMENDACIONES POST OPERATORIAS PARA DOBLE OSTEOTOMÍA PÉLVICA

Deberá administrarle al paciente antibioterapia, ANÉS, analgésicos y posteriormente condroprotectores prescritos por su veterinario, se le entregara vendado para evitar la aparición de seromas, el vendaje se retirara a los 3 o 4 primeros días, las heridas quirúrgicas necesitaran de desinfección diaria 2 – 3 veces al día con clorhexidina o povidona yodada, los drenajes se retiraran cuando pierdan su función aproximadamente a los 8- 10 días. Si existiera la aparición de seromas se recomienda su aspirado. Si existiera edema del miembro realizar hidroterapia con agua fría y masajes unos días. Si el animal tiene problemas al orinar acuda a su veterinario.

La función del miembro dependerá del estado del animal antes de la cirugía, existirá limitación del movimiento de abducción, la extremidad puede presentar rotación externa que ira disminuyendo en los primeros meses.



Los controles radiológicos se realizarán en la tercera o cuarta semana, después mensuales hasta los 6 meses que se harán anuales.

El animal deberá estar en absoluto reposo durante 6 semanas y durante las 4 posteriores comenzar con paseos cortos siempre con correa, si es posible natación, terapia pasiva y posteriormente rehabilitación.

Las complicaciones pueden ser selección incorrecta del paciente, neuropatías, pérdida de fijación del implante, obstrucción uretral, reducción del canal pélvico, osteotomía incorrecta, osteomielitis, dolor, sobre rotación o incumplimiento del propietario, la colaboración de este es primordial para que sea exitoso el periodo postoperatorio.