

RECOMENDACIONES POST OPERATORIAS FIJACIÓN EXTERNA

Su animal acaba de ser operado y externamente presenta agujas percutáneas y barras de fijación. Es el sistema de elección en ciertos casos como en fracturas abiertas. Deberá administrarle antibióticos, AINE´s y analgésicos como le prescriba el veterinario.



El paciente deberá estar confinado y restringir su actividad, ya que los fijadores pueden enredarse o el animal puede golpear accidentalmente con ellos.

Los trayectos de las agujas no necesitan tratamiento específico, a menos que se lo indique su veterinario y se curaran por segunda intención.

En algunas ubicaciones el movimiento del tejido blando contra el clavo es inevitable y puede causar drenaje, se limpiara con peróxido de hidrogeno diluido o povidona yodada.

Otra posible complicación es la necrosis ósea alrededor de alguna aguja, es de forma circular y causa infección secundaria, drenaje y aflojamiento, se tratará con extracción de la aguja, raspado del sequestro y reemplazo de esta si es necesario.

Se deben tomar radiografías a intervalos regulares para ver la consolidación de la fractura, que es fácil de valorar por la presencia del callo óseo.

A veces es bueno dinamizar el fijador cuando comienza a formarse el callo y retirar algunas agujas. Las rótulas si son del tipo Meynard deberán de revisarse mensualmente para asegurar su estabilidad.

Los fijadores se retiran bajo sedación o anestesia, cuando los signos radiográficos y clínicos de la unión ósea se confirman, primero las agujas transfixantes localizadas en el centro, con frecuencia se produce hemorragia de los trayectos pero con un vendaje es suficiente.

-Tiempo aproximado de retirada del fijador

Edad	Fijador externo tipo I y II	Fijador externo tipo III
< 3 meses	2-3 semanas	1 mes
3-6 meses	1-1,5 meses	1,5-3 meses
6-12 meses	1,5-2 meses	3-4 meses
>1 año	2-3 meses	4-7,5 meses



