

RECOMENDACIONES POST OPERATORIAS TTA:

-**Primeros 5 días:** Compresas con hielo 2 a 3 veces al día durante 10-20 minutos.

Control del dolor: Prescrito por su veterinario AINE'S y tramadol.

-**Después de 5 días:** Aplicar calor sobre el área 2 a 3 veces diarias por 10-20 minutos.

Mover la extremidad después de aplicar el calor cuidadosamente. Luego comience un rango de movimientos suaves durante 20 a 30 repeticiones si es tolerado, si hay inflamación no lo haga.

Ningún otro ejercicio es recomendado en las 2 primeras semanas.

Limpieza diaria de la herida quirúrgica y uso de collar isabelino.

- **2 primeras semanas:** Paseo siempre con correa.

Control del dolor.

Aplicar calor durante 20 minutos, luego flexionar y extender la extremidad cuidadosamente. En un rango de movimiento normal.

Caminar con correa aumentando el paseo progresivamente sino hay dolor. Evitando las paradas, si es tolerado por su perro aumentar la duración cada 4 días progresivamente.

-**Tras las 2 primeras semanas:**

Los paseos deben de ser de 20 minutos o más si no presenta dolor.

La hidroterapia ayuda pero siempre menos de 10 minutos y con el animal siempre vigilado. Si es excesiva puede producir inflamación del ligamento rotuliano y producir cojera.

- **6 a 8 semanas:**

Es el momento de realizar un control radiográfico por su veterinario y ver si hay unión del sitio de la osteotomía. Si es así deberemos poco a poco volver a la actividad normal sino hay dolor.



Los ejercicios de sentado así como subir escaleras serán de ayuda en la fisioterapia.

